

بررسی تأثیر استفاده از وسایل فردی حفاظت شنوازی در محیط پرسروصدا بر روی فشارخون و ضربان قلب

غلامرضا پوریعقوب^{*}، خسرو صادق نیت حقیقی^۱، فرشید سبزعلیان^۲

۱ و ۲- متخصص طب کار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- متخصص طب کار، دانش آموزه دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ پذیرش: ۸۷/۲/۵

تاریخ دریافت: ۸۶/۱۰/۳

چکیده:

مقدمه: سروصدا به عنوان شایعترین آلاینده محیط‌های صنعتی علاوه بر ایجاد افت شنوازی، روی سیستم‌های دیگر بدن نیز می‌تواند اثر نامطلوب داشته باشد. مدارک متعددی به نفع تأثیر سروصدا بر روی سیستم قلبی عروقی در مطالعات به دست آمده است. یکی از راههای کاهش مواجهه با سروصدا استفاده از وسایل فردی حفاظت شنوازی می‌باشد. بطور تئوریک کنترل مواجهه با وسایل حفاظت فردی احتمالاً اثرات قلبی عروقی مواجهه با صدا را نیز کنترل می‌نماید. البته مطالعه خاصی در مورد این اثر وسایل حفاظت فردی صورت نگرفته است. در این مطالعه اثر استفاده از وسایل حفاظت فردی شنوازی در محیط پرسروصدا بر روی فشارخون دیاستولیک، سیستولیک و تعداد ضربان قلب ارزیابی شده است.

روش بررسی: طی یک مطالعه مداخله‌ای با تعداد نمونه ۳۰ نفر کارگر که حداقل ۸ ساعت در محل کار با سروصدای بالاتر از ۸۵ dB مواجهه داشتند ارزیابی شد. در ابتدا فشارخون و تعداد ضربان قلب آنها بعد از ۵ دقیقه نشستن در محل کار بین ساعت‌های ۱۰-۱۱ صبح در سه نوبت با رعایت شرایط استاندارد گرفته شد. پس از آن ضمن توصیه به استفاده از گوشی و آموزش‌های لازم در این زمینه، تمامی کارگران از نظر استفاده از گوشی تحت نظر قرار گرفتند. در حین استفاده از گوشی در طول ۲ هفته مجدداً فشارخون و ضربان قلب کارگران اندازه گیری شد.

یافته‌ها: میانگین فشارخون سیستولیک بعد از استفاده از گوشی ۵/۷۰ mmHg کاهش یافت ($P=0.0040$). میانگین فشارخون دیاستولی بعد از استفاده از گوشی به میزان ۲/۱۳ mmHg کاهش یافت ($p=0.05$). اختلاف میانگین تعداد ضربان قلب قبل (۷۰/۵۵) و حین استفاده از گوشی (۶۹/۸۱) از نظر آماری معنی دار نبود ($p=0.635$).

نتیجه‌گیری: اختلاف مشاهده شده در فشارخون افراد با اینکه شاید از نظر بالینی اهمیت چندانی نداشته باشد، ولی از نظر آماری معنی دار بود. بنابراین توصیه به استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط‌های پرسروصدا علاوه بر کاهش اثر سروصدا بر سیستم شنوازی، اثر این مواجهه شغلی را بر سیستم قلبی - عروقی نیز کاهش می‌دهد که می‌تواند از نظر بالینی اهمیت قابل توجه داشته باشد.

واژگان کلیدی: سروصدا، افت شنوازی ناشی از سروصدا، وسایل حفاظت فردی، فشارخون

مقدمه

در مطالعات متعدد اثرات مثبت استفاده از وسایل حفاظت شنوازی در جلوگیری از افت شنوازی ناشی از سروصدای اثبات رسیده است. بنابراین استفاده از وسایل حفاظت شنوازی قطعاً در پیشگیری از ابتلا به افت شنوازی ناشی از سروصدای مؤثر است. اما در مورد تأثیر استفاده از وسایل حفاظت فردی شنوازی در جلوگیری از اثرات نامطلوب سروصدای روی سیستم قلبی-عروقی، مطالعات و اطلاعات اندکی وجود دارد. بطور تئوریک کنترل مواجهه با وسایل حفاظت فردی احتمالاً اثرات قلبی-عروقی مواجهه با صدا را نیز کنترل می نماید. ولی قطعیت اثر استفاده از وسایل فردی حفاظت شنوازی در پیشگیری از اثرات قلبی-عروقی مواجهه با سروصدای مطالعات کنترل شده ارزیابی نشده است. لذا در این مطالعه سعی کرده ایم اثرات حفاظتی استفاده از وسایل فردی حفاظت شنوازی را بر روی فشار خون سیستولی، دیاستولی و تعداد ضربان قلب در محیط پر سروصدای مورد بررسی قرار دهیم.

روش بررسی

برای انجام مطالعه، یک کارخانه تولیدی که در آن بر اساس نتایج اندازه گیری صوت توسط کارشناس بهداشت حرفة ای و نقشه صوتی تهیه شده کارخانه حدود ۱۰۰ نفر از کارگران با سروصدای بالای ۸۵ دسی بل مواجهه داشتند انتخاب شد. تقریباً هیچکدام از کارگران از وسایل حفاظت فردی شنوازی استفاده نمی کردند. جهت ورود داوطلبانه کارگران به مطالعه، اهداف و شرایط مطالعه به اطلاع کلیه این کارگران رسانده شد. از بین کارگرانی که روزانه حداقل ۸ ساعت با سروصدای بالای ۸۵ دسی بل مواجهه داشتند و اصلًا از وسایل حفاظت فردی شنوازی استفاده نمی کردند تعداد ۳۰ نفر وارد مطالعه شدند.

پس از کسب رضایت آگاهانه کتبی از داوطلبان و شرح چگونگی انجام مطالعه در مرحله اول طی سه نوبت در سه روز پیاپی بین ساعات ۱۰ تا ۱۱ صبح (۲) الی ۴ ساعت پس از شروع کار، فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و تعداد ضربان قلب هر کدام از کارگران در محل کار حین مواجهه با سروصدای بالای ۸۵ دسی بل اندازه گیری شد. میانگین این ۹ نوبت اندازه گیری به ترتیب به عنوان فشارخون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک

سروصدای شایعترین آلاتینه محیط های صنعتی بوده که می تواند موجب اختلالات متعددی در ارگانهای مختلف بدن شود. شناخته شده ترین اثر نامطلوب سروصدای افت شنوازی ناشی از آن می باشد. افت شنوازی ناشی از سروصدای بعد از پیرگوشی شایعترین علت افت شنوازی است. اثرات نامطلوب صدا تنها به سیستم شنوازی محدود نبوده و ارگانهای دیگر نیز ممکن است در مواجهه حاد یا مزمن با سروصدای بالای حد استاندارد پاسخ نامطلوب از خود نشان بدھند. سیستم قلبی-عروقی یکی از ارگانهایی است که اثرات نا مطلوب سر و صدا بر روی آن بررسی شده است. در مطالعات متعدد روی کارگران شاغل در محیطهای پرسروصدای مشاهده شده است که مواجهه دراز مدت با صدای بالای ۸۰ دسی بل باعث افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا می شود (۴،۳،۲،۱). اثرات قلبی-عروقی مواجهه با صدا می تواند در عمل موجب عوارض غیر قابل برگشت و حتی افزایش میزان مرگ و میر ناشی از انفارکتوس میوکارد گردد (۵). همچنین مشاهده شده است که در کارگرانی که دچار افت شنوازی ناشی از سروصدای هستند خطر ابتلا به فشار خون بالا بیشتر می باشد (۷،۶). این اثر سروصدای بر روی سیستم قلبی-عروقی از طریق دستگاه شنوازی اعمال می گردد. بطوری که در مطالعه ای که روی کودکان ناشنوازی مادرزاد و کودکان دارای شنوازی طبیعی مشاهده شده که در کودکان با شنوازی طبیعی مواجهه حاد با سروصدای بالا موجب پاسخ قلبی عروقی و افزایش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک می گردد، در حالی که این افزایش در کودکان ناشنوازی مادرزاد مشاهده نمی گردد (۸). احتمالاً اثرات قلبی عروقی سروصدای با مکانیسم استرس حاد ایجاد می شود. مهمترین مکانیسم مطرح در مورد اثر سروصدای بر سیستم قلبی-عروقی، آزاد شدن هورمونهای آدرنوکورتیکال و مدلیاتورهای سمپاتیک در اثر سروصدای است که می تواند باعث افزایش ضربان قلب و بالارفتن فشارخون شود (۱۰،۱۱،۱۰،۹). همچنین افزایش میزان کاتکولامین های ادراری بعد از یک شیفت کاری در کسانی که با سروصدای مواجهه داشتند، مشاهده شده است (۹). همراهی هیپرلیپیدمی، افت شنوازی ناشی از سروصدای و مواجهه با سروصدای نیز مشاهده شده است (۷).

به دلیل اینکه مداخله محقق یک روش پیشگیری و کاهش خطر بوده، کلیه افراد آگاهانه و داوطلبانه وارد مطالعه شده اند و امکان استفاده از روش پیشگیری پیشنهادی مطالعه بدون ورود به مطالعه برای سایر کارگران نیز فراهم بود، مسائل اخلاقی در اجرای پژوهش رعایت شده و از این لحاظ مورد تأیید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است.

یافته ها

اطلاعات بدست آمده از ۲۷ کارگر مورد مطالعه جمع بندی و آنالیز شد و نتایج زیر حاصل گردید. تمام ۲۷ کارگر مرد بوده و میانگین سنی آنها ۴۴/۶ سال بود. جوانترین آنها ۲۸ سال و مسن ترین آنها ۶۲ سال سن داشت. میانگین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و تعداد ضربان قلب در جدول شماره ۱ مشاهده می شود. اختلاف بین این متغیر ها پیش و پس مداخله با استفاده از آزمون τ زوجی مقایسه شد که در مورد میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک معنی دار و در مورد متغیر دیگر با وجود کاهش میزان متغیر، پس از مداخله، تفاوت مشاهده شده معنی دار نبود. ارتباط تغییرات فشار خون و ضربان قلب با متغیر سن توسط آزمون τ نمونه های مستقل آزمون شد که ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

و ضربان قلب نوبت اول در نظر گرفته شد. جهت اندازه گیری فشار خون از فشارسنج جیوه ای استفاده شد. تعداد ضربان قلب توسط لمس نبض رادیال و شمارش تعداد ضربان طی یک دقیقه توسط محقق صورت گرفت. تمام اندازه گیری ها در حالت نشسته و پس از ۵ دقیقه استراحت انجام گرفت. در مرحله دوم، پس از آموزش های لازم جهت استفاده از وسیله حفاظت شنایی، از کارگران درخواست شد که در محیط کار بطور مرتب از وسیله حفاظت شنایی (ear plug) با حداقل NRR مساوی ۲۰ که در اختیارشان قرار داده شد استفاده کنند. پس از آن به مدت ۲ هفته کارگران از نظر استفاده مرتب از وسیله حفاظت شنایی توسعه پرسنل بهداشتی تحت نظر قرار گرفتند. طی این دو هفته مجدداً بین ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح در سه نوبت در سه روز پیاپی فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و تعداد ضربان قلب کارگران اندازه گیری شد. میانگین اندازه گیری ها (۹ نوبت) در سه روز به ترتیب بعنوان فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک و تعداد ضربان قلب نوبت دوم در نظر گرفته شد. تمام شرایط، روش و ابزار اندازه گیری در مرحله دوم مانند مرحله اول بود و فقط کارگران از وسیله حفاظت شنایی استفاده می کردند. در طول مطالعه ۳ نفر از کارگران به دلیل عدم همکاری مناسب و استفاده نامرتب از وسیله حفاظت شنایی از مطالعه خارج شدند و مطالعه با ۲۷ نفر پیگیری شد.

جدول ۱. مقایسه میانگین فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و تعداد ضربان قلب قبل و بعد از مداخله

P-value	میانگین فشار خون سیستولیک	میانگین فشار خون دیاستولیک	میانگین تعداد ضربان قلب
حین مواجهه	حین استفاده از گوشی	حین استفاده از گوشی	حین مواجهه
۰/۰۰۴	۵/۷۰	۱۱۶/۸۱	۱۲۲/۵
۰/۰۵	۲/۱۲	۷۴/۴۶	۷۶/۶۰
۰/۶۳۵	۰/۷	۶۹/۸	۷۰/۵

متوالی (جمعاً هر کدام از موارد ۹ بار در هر مرحله) اندازه گیری شده و میانگین آنها محاسبه شد. تمام اندازه گیری ها در شرایط یکسان انجام گرفت. بنابراین نتایج مشاهده شده در مطالعه با احتمال بیشتری ناشی از مداخله ای می باشد که طی مطالعه صورت گرفته است. البته میزان تغییرات مشاهده شده در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بدبناial استفاده از وسیله حفاظت

بحث و نتیجه گیری

جهت کاهش اثرات تغییرات احتمالی شرایط فیزیکی، روحی-روانی و دیگر حالت هایی که بر روی فشار خون و ضربان قلب مؤثر می باشند و کمرنگ کردن تغییرات ناشی از دقت در اندازه گیری هر کدام از داده های فشار خون و ضربان قلب، قبل و حین استفاده از وسیله حفاظت شنایی، در سه نوبت و سه روز

تحقیق با نتایج مطالعه Wu TN و همکارانش در مورد اثرات قلبی-عروقی مواجهه با سروصدا بر روی کودکان ناشناخته کودکان سالم همخوانی دارد (۸). البته چون در این مطالعه بیشتر اثرات حاد استفاده از وسیله حفاظت فردی بر فشار خون مورد بررسی قرار گرفته است، بر اساس نتایج این مطالعه در مورد اینکه استفاده از این وسایل در محیط‌های پرسروصدا در دراز مدت نیز بتواند موجب کاهش اثرات منفی سروصدا بر روی سیستم قلبی عروقی گردد، نمی‌توان اظهار نظر قطعی نمود.

شنوازی فردی در این مطالعه از نظر بالینی اهمیت چندانی ندارد، ولی این مطالعه حداقل می‌تواند مؤید این موضوع باشد که استفاده از وسیله حفاظت شنوازی در مواجهه با سروصدا علاوه بر پیشگیری از افت شنوازی می‌تواند بر روی اثرات ناخواسته سروصدا بر روی سیستم قلبی-عروقی نیز مؤثر باشد و احتمالاً این اثر حفاظتی در مورد افرادی که پاسخ تشدید یافته به اثرات سروصدا دارند یا در مواردی که از گوشی‌های با NRR بالاتر استفاده شود از نظر بالینی می‌توان حائز اهمیت باشد.. یافته این

مراجع

- 1- Fogari R, Zoppi A, Vanasia A, Maraci G, Villa G. *Occupational noise exposure and blood pressure*. J Hypertens. 1994; 12(4):475-9.
- 2- Tomei F, De Sio S, Tomao E, Anzelmo V, Baccolo TP, Ciarrocca M. *Occupational exposure to noise and hypertension in pilots*. Int J Environ Health Res. 2005; 15(2):99-106.
- 3- Nowak S. *The influence of noise on increased arterial blood pressure in workers during the workday*. Pol Merkur Lek. 1996 Dec; 1(6):389-93.
- 4- Talbott EO, Gibson LB, Burks A, Engberg R, McHugh KP. *Evidence for a dose-response relationship between occupational noise and blood pressure*. Arch Environ Health. 1999; 54(2):71-8.
- 5- Davies HW, , Teschke K, Kennedy SM, Hodgson MR, Hertzman C, Demers PA. *Occupational exposure to noise and mortality from acute myocardial infarction*. Epidemiology; 2005; 16(1):25-32.
- 6- Talbott EO, Findlay RC, Kuller LH, Lenkner LA, Matthews KA, Day RD, Ishii EK. *Noise-induced hearing loss: a possible marker for high blood pressure in older noise-exposed populations*. J Occup Med. 1990 Aug; 32(8):690-7
- 7- Pillsbury HC. Hypertension, hyperlipoproteinemia, chronic noise exposure: is there synergism in cochlear pathology? *Laryngoscope*. 1986 Oct; 96(10):1112-38
- 8-Wu TN, Chiang HC, Huang JT, Chang PY. *Comparison of blood pressure in deaf-mute children and children with normal hearing: association between noise and blood pressure*. Int Arch Occup Environ Health. 1993; 65(2):119-23.
- 9- Rojas-Gonzalez L, Martínez-Leal R, Paz-Araviche V, Chacín-Almarza B, Corzo-Alvarez G, Sanabria-Vera C. *Serum cortisol levels in pre and post journal labor and non auditory manifestations in noise exposed workers of a brewer industry*. Invest Clin. 2004; 45(4):297-307.
- 10- Gamallo A, Alario P, Gonzalez-Abad MJ, Villanua MA. *Acute noise stress, ACTH administration, and blood pressure alteration*. Physiol Behav. 1992; 51(6):1201-5.
- 11- Engeland WC, Miller P, Gann DS. *Pituitary-adrenal and adrenomedullary responses to noise in awake dogs*. Am J Physiol. 1990; 258(3 Pt 2):R672-7.
- 12- Cavatorta A, Falzoi M, Romanelli A, Cigala F, Riccò M, Bruschi G, Franchini I, Borghetti A. *Adrenal response in the pathogenesis of arterial hypertension in workers exposed to high noise levels*. J Hypertens Suppl. 1987; 5(5):S463-6.